

PENYAKIT SELSEMA BURUNG

01

Punca/Origin

Disebabkan oleh virus avian influenza (VAI). Unggas adalah reservoir VAI dan tahap penyakit adalah pelbagai, dari tiada simptom sehingga kepada kematian berbeza mengikut jenis unggas.

02

Migrasi

Burung migrasi/hijrah sebagai reservoir akan membawa VAI dan disyaki sebagai punca sebaran kepada ayam domestik melalui pencemaran air dan makanan didalam najis, cecair pernafasan dan bangkai burung.

03

Transmisi/Sebaran ke Ayam

Cecair pernafasan/Droplet

Tersebar dari ayam terjangkau kepada ayam/unggas lain yang tersedut droplet terjangkau

Bulu pelepah

Boleh menjadi punca sebaran Jika terkena ayam/unggas lain


Najis

Boleh menjadi punca sebaran jika mencemar air dan makanan

04

Jangkitan Manusia

Manusia boleh terjangkau samada secara langsung bersentuhan dengan ayam terjangkau atau peralatan yang terkontaminasi dengan VAI. Jika manusia terjangkau dengan subtipe yang sudah teradaptasi menjadi virus influenza manusia (H1N1, H2N2, H3N2), maka transmisi manusia ke manusia boleh berlaku



VEKTOR MEKANIKAL


Peralatan reban ayam juga boleh menjadi agen penyebaran

NAJIS UNGGAS - CEMAR TANAH

VAI dari pelbagai subtipe dari ayam atau unggas boleh mencemari persekitaran dan terkena ayam/unggas lain dan manusia boleh menyebabkan berlaku jangkitan




HOS DAN SUBTIP-SUBTIP VAI



SILA LAPOR KEPADA PEJABAT VETERINAR BERDEKATAN JIKA MENDAPATI KEMATIAN AYAM/UNGGAS YANG TINGGI @ EMAIL KEPADA :

adic@dvs.gov.my

www.dvs.gov.my



JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR MALAYSIA