

MASTITIS

Cegah

Kenal pasti

Rawat

Sebelum kelahiran



Sembur puting susu
2-3 minggu sekali

Beranak di atas kawasan kering – elakkan lumpur dan kelembapan

Perah susu sebelum kelahiran sekiranya terdapat titisan susu

Lihat sebarang ambing susu bengkak/panas semasa lembu masuk kedalam kandang

Jangan perah susu kecuali ambing susu induk panas/bengkak menandakan mastitis

Rawat dengan antibiotik jika berlaku mastitis

Kosongkan ambing susu sebelum rawatan. Perah susu induk jika boleh

Pantau tempoh penarikan (*withholding*) anak lembu jantan jika dijual

Selepas kelahiran (induk kolostrum)



Perah susu dalam tempoh 12-24 jam selepas kelahiran

Sembur dengan ‘teat spray’ puting susu selepas setiap pemerahan susu

Periksa jika ada puting susu rosak

Perah (strip) sedikit susu dari setiap belah ambing susu (quarter) dan periksa tanda klinikal pada setiap kali pemerahan susu

Periksa semua induk sebelum dikeluarkan dari kumpulan induk kolostrum untuk kenal pasti induk dengan kiraan selsomatik (*somatic cell count-SCC*) tinggi untuk dipantau

Rawat dengan antibiotik untuk induk perah jika berlaku mastitis. Kosongkan ambing sebelum rawatan

Patuh TRA R - Tanda, Rekod, Asing dan Rawat

Induk perah



Perah susu dengan bersih (letakkan corong pemerahan susu pada puting susu yang bersih dan kering, pastikan tangan bersih atau pakai sarung tangan)

Selenggara mesin perah susu untuk cegah kerosakan puting susu

Perah (strip) sedikit susu semua induk setiap minggu untuk kesan tanda klinikal terutama pada 6-8 minggu pemerahan

Perah (strip) susu apabila terdapat ketulan susu pada penapis susu atau SCC meningkat

Perah (strip) susu induk yang mempunyai SCC yang tinggi selepas ujian gerompok untuk memeriksa tanda klinikal

Rawat dengan antibiotik untuk induk perah jika berlaku mastitis

Kosongkan ambing sebelum rawatan. Rawat hanya induk yang mempunyai SCC yang tinggi jika dinasihat oleh doktor atau pihak veterinar

Patuh TRA R

Induk dirawat



Perah susu induk yang di rawat paling akhir dan asingkan daripada kumpulan induk lain untuk kurangkan sebarangjangkitan

Sembur dengan ‘teat spray’ puting susu selepas setiap pemerahan susu

Perah (strip) susu untuk tentukan tanda klinikal penyembuhan selepas rawatan terakhir dan di akhir tempoh penarikan (*withholding*)

Ambil sampel untuk pengasingan bakteria dari kes klinikal yang berterusan

Susu tidak dicampur kedalam tangki bulk sepanjang tempoh penarikan (*withholding*)

Sekiranya tanda klinikal tidak berkurangan sehingga akhir tempoh penahanan, maklumkan kepada pihak veterinar

Induk kering



Guna rawatan induk kering (dry cow treatment - DCT) selepas pemerahan susu terakhir bagi mencegah mastitis semasa tempoh kering susu

Dapatkan khidmat nasihat pihak veterinar berkenaan *teat sealants* dan mastitis pada lembu dara

Sembur dengan ‘teat spray’ puting susu selepas sebarang pemeriksaan

Periksa induk 7-14 hari selepas dikeringkan

Sentuh sekiranya terdapat ambing yang panas/bengkak, jangan perah induk kecuali induk disyaki ada mastitis

Rawat induk yang mengalami SCC yang tinggi dengan rawatan *DCT* di peringkat pengeringan

Tanda induk yang diberi rawatan *DCT* sekiranya perahan susu dibuat dari induk yang berbeza. Sekiranya berlaku mastitis, perah ambing susu dan rawat dengan antibiotik

Rekod segala butiran dengan terperinci